mirius™
global hygiene solutions

Virucidal WP

Guía de referencia rápida
para múltiples aplicaciones



Desinfección de vehículos

Aplicar como spray húmedo utilizando sistemas de pulverización automáticos o una lanza manual. Mantener las soluciones preparadas alejadas de la luz solar directa.


1 % (1:100) 10 g por litro



Desinfección de botas

Utilizar como parte de un sistema de entrada danés: cambiarse las botas al entrar en cada nave. Lave previamente las botas en un baño de agua o en un limpiador automático de botas antes de la desinfección. Prepare la solución y coloque la bandeja de inmersión de botas fuera de la luz solar directa. Cambie la solución cada 3-4 días o antes si está muy sucia.

1 % (1:100) 10 g por litro



Fin del ciclo de producción

Edificio y equipo: aplique como pulverizador húmedo utilizando una boquilla de chorro en abanico o un pulverizador de volumen sobre superficies previamente limpias y secas. Virucidal WP se puede utilizar para programas de desinfección en un solo paso como desinfectante total de la nave y el equipo. Para programas de varios pasos, aplique Virucidal WP como primer desinfectante.


0,5 % (1:200) 5 g por litro o 1 % (1:100) 10 g por litro

Sistema de agua potable: Adecuado para sistemas con depósito de cabecera/suministro.



1. Cierre la entrada de agua y drene el sistema.
2. Llene el tanque de suministro con agua y añada el producto.
3. Haga pasar la solución por todos los extremos de las tuberías y déjela actuar durante un mínimo de 4 horas.
4. Asegúrese de que todas las boquillas/ bebederos estén drenados.
5. Drene el sistema y observe la calidad del agua.
6. Vuelva a llenar y enjuague el sistema. Repita si el agua sigue estando sucia.
7. Opcional: utilice un kit de endoscopio para inspeccionar el interior de las tuberías.


1 % (1:100) 10 g por litro



Reducción de la presión patógena

Almohadillas refrigerantes: para su uso en sistemas de refrigeración con agua circulante, añadir directamente al depósito de agua o dosificar mediante una solución madre preparada.

0,5 % (1:200) 5 g por litro



Nebulización aérea (sujeta a la aprobación de las autoridades locales): aplicar como pulverización gruesa (35-50 micras) a 2 metros por encima de las aves alojadas. No pulverizar directamente sobre las aves. Si los ventiladores están en funcionamiento, aplicar alejándose de los conductos de ventilación. La dilución y la frecuencia dependen del nivel de presión de los patógenos.

0,5 % (1:200) 5 g por litro

Desinfección y acidificación del agua potable (sujeto a la aprobación de las autoridades locales)
Prepare una solución al 5 % en un recipiente abierto (no la guarde en recipientes cerrados).

Dose la solución preparada al 5 % en la línea de agua en:

- 2 % para una dilución de 1:1000 (para períodos de riesgo de enfermedad previsto)
- 1 % para una dilución de 1:2000 (dilución predeterminada)
- No aplicar junto con vacunas, medicamentos, minerales, vitaminas o probióticos
- Compruebe el pH final del agua para confirmar el nivel objetivo.



1 % (1:2000) 0,5 g por litro a 2 % (1:1000) 1 g por litro

La información proporcionada se basa en datos técnicos que Mirius™ considera fiables y está destinada a personas con los conocimientos técnicos adecuados, que la utilizarán bajo su propia responsabilidad y riesgo. Dado que las condiciones de uso escapan a nuestro control, Mirius™ no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, y no acepta ninguna responsabilidad por el uso de esta información. Este documento no concede ninguna licencia para operar bajo ninguna patente o solicitud de patente, ni implica ninguna recomendación para infringirlas. Lea siempre la etiqueta del producto, el prospecto y la ficha de datos de seguridad para evaluar y gestionar cualquier peligro.